



### **Saneringsregime mot luftsekkmidd (*Sternostoma* spp.)**

Gjelder finkefugler som er mottakelige for luftsekkmidd f.eks. gouldsamadiner.

Behandling bør skje utenom hekkesesongen og skal gjentas 3 ganger for full sanering av flokken. Sanering betyr at man utrydder smitten i flokken.

Behandling foregår med en fortynnet Ivomec vet. løsning som dryppes i halsgropa eller på låret til fuglene. Det brukes 1 dråpe per fugl for fugler opp til 30 gram – som f.eks. gouldsamadiner. Doseringen multipliseres så ut ifra kroppsvekt, så større finker kan få 2 dråper.

#### **Regime for sanering med Ivomec vet. dråper (opptil 30 gram kroppsvekt):**

Dag 0: 1 dråpe fortynnet Ivomec vet. på lår eller i halsgropa.

Dag 21: 1 dråpe fortynnet Ivomec vet. på lår eller i halsgropa.

Dag 42: 1 dråpe fortynnet Ivomec vet. på lår eller i halsgropa.

Sanering er ferdig 20 dager etter siste dosering. Det er litt omstendelig, men vel verdt det.

Hensikten med å behandle flere ganger er å bryte livssyklusen til parasitten ved å behandle nyklekkede luftsekkmidd før de legger egg. To behandlinger gir usikker effekt, derfor anbefales alltid 3 behandlinger. Behandlingen har ikke effekt på parasitteggene.

Du får Ivomec fra en fugleveterinær. Ivomec vet (ivermectin) er reseptbelagt og ulovlig å bestille på nettet.

Mvh

Evert Jor, veterinær hos NORAQ Inventus AS